



Indicaciones

Nopiox® (miristato de isopropilo) es eficaz para el tratamiento de la pediculosis, cuando se detecta la presencia de piojos vivos.

Dosis y Administración

La aplicación de **Nopiox®** (miristato de isopropilo) realizando los siguientes 3 pasos garantiza la muerte de los piojos y la eliminación de las liendres.



**SOLUCIÓN
PEDICULICIDA**

**10
min**

Composición

Cada 100 g de **Nopiox®** contienen:

Miristato de isopropilo 50 g
Vehículo (Ciclotericona 5) c.s.p. 100 g

Propiedades

Nopiox® (miristato de isopropilo) es una solución incolora e inodora que contiene miristato de isopropilo y ciclotericona 5; actúa mediante un mecanismo de acción físico creando una película sobre el cabello y los piojos. Esta película disuelve la capa lípida que recubre al piojo, haciéndolo más susceptible a la pérdida de agua provocando que se deshidrate y muera. Dado este mecanismo de acción, no se espera que el uso de **Nopiox®** (miristato de isopropilo) genere resistencia en los piojos.

El efecto se produce muy rápidamente bastando 10 minutos para que **Nopiox®** (miristato de isopropilo) actúe luego de aplicado.

1 Aplicación de **Nopiox®** (miristato de isopropilo)

- **Nopiox®** (miristato de isopropilo) debe aplicarse sobre el pelo limpio y seco.
- Peinar el pelo seco con un peine normal cuidando que no quede enredado.
- Luego de agitar el frasco, aplicar **Nopiox®** (miristato de isopropilo) sobre el cabello seco evitando el contacto con ojos y mucosas. Masajear hasta cubrir el cuero cabelludo y todo el largo del cabello.
- La cantidad de producto requerida varía en función de la cantidad y largo del cabello. El pelo debe quedar empapado en la solución.
- Dejar actuar 10 minutos (para evitar goteo puede recoger el cabello con un gorro de un solo uso)

2 Transcurridos los 10 minutos

Tomando pequeñas porciones de cabello por vez, pasar el peine fino desde la raíz a las puntas. Lavar el peine fino para eliminar pelos, piojos y liendres después de cada pasada y secarlo con un pañuelo de papel antes de pasarlo por el próximo mechón.

Completado el procedimiento, lavar la cabeza con abundante champú por lo menos dos veces, enjuagar y no aplicar acondicionador. El agua tibia facilita el enjuague.

3 A pesar de que la primera aplicación debería matar todos los piojos y eliminar las liendres, cuando la infestación es muy masiva, puede ocurrir que algunas liendres hayan permanecido, se incuben y aparezcan piojos nuevamente. Por esto es muy importante a los 7 días del tratamiento inicial verificar la presencia de piojos vivos, si esto ocurre repetir el tratamiento.

Si es necesario se puede realizar una nueva aplicación a los 14 días para terminar de romper este ciclo de vida del piojo.

Cuando se detecta la presencia de piojos en un miembro de la familia o comunidad se debe verificar si los demás miembros están libres de piojos, de no ser así

también deben recibir tratamiento, lo ideal es que lo reciban todos a la vez para disminuir las posibilidades de reinfección.



Contraindicaciones

Alergia a los componentes de **Nopiox®** (miristato de isopropilo).

Precauciones y advertencias

Si al aplicar **Nopiox®** (miristato de isopropilo) experimenta algún tipo de reacción de sensibilidad (picazón, ardor o enrojecimiento) en cuero cabelludo u otras zonas discontinúe la aplicación, enjuague con abundante agua y consulte a su médico. Debe evitarse el contacto de **Nopiox®** (miristato de isopropilo) con los ojos, mucosas, heridas de la piel o cuero cabelludo. Si accidentalmente se produjera el contacto, lavar la zona con abundante agua tibia. Tener en cuenta que **Nopiox®** (miristato de isopropilo) es un líquido aceitoso y por lo tanto si cae sobre la ropa puede manchar y si cae al piso la superficie puede quedar resbaladiza por lo que se recomienda el lavado inmediato del área con abundante jabón y agua tibia. Otra precaución que se debe tener cuando se aplica **Nopiox®** (miristato de isopropilo) es cuidar que no haya ninguna fuente de ignición próxima, tal como cigarrillos encendidos o llamas de cualquier origen.

Embarazo y Lactancia

Debido a que no se dispone de información sobre el uso de este producto durante el embarazo y la lactancia, se sugiere que las mujeres que están embarazadas o amamantando consulten a su médico antes de usar este producto.

Uso pediátrico

No aplicar **Nopiox®** (miristato de isopropilo) a menores de 2 años.

Reacciones colaterales

Eventualmente puede ocurrir que en personas con piel muy sensible aparezca algún tipo de irritación que se alivie inmediatamente suspendiendo la aplicación y lavando con abundante agua. La piel afectada de acné puede ser más propensa a sufrir inflamación si tuviera contacto con el producto.

Interacciones

Si se han realizado tratamientos previos con otros productos pediculicidas, antes de aplicar **Nopiox®** (miristato de isopropilo) se debe lavar la cabeza adecuadamente con champú cosmético.

Sobredosis

Nopiox® (miristato de isopropilo) se aplica externamente, NO SE INGIERE, en caso de ingestión accidental contactarse con el **Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (C.I.A.T.)** - Tel.: 1722

Presentaciones

Frasco contenido 120 mL de solución pediculicida.

Condiciones de conservación

Mantener a temperatura ambiente (15°C - 30°C). El frasco debe mantenerse bien cerrado y dentro de su caja (no debe exponerse a la luz), lejos de alimentos y bebidas y fuentes de calor.

No utilizar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Fabricado por:

Eurofarma Argentina S.A.
Buenos Aires - Argentina
Para: Eurofarma Uruguay S.A.
Víctor Solís 349, Piso 20
Sinerjia Faro - Tel.: 2401 5454
Montevideo - Uruguay

