

Bisal® frutal

Carbonato de Calcio;

Hidróxido de Aluminio+Carbonato de Magnesio

Antiácido masticable

Fórmula

Cada comprimido masticable de **Bisal® frutal** contiene

Carbonato de Calcio 450 mg; Hidróxido de Aluminio+Carbonato de Magnesio (óxido de Aluminio 41,5%, Óxido de Magnesio 8,0%, Carbonatos 12,0%) 50 mg; excipientes c.s.

Excipientes: azúcar; manitol; lactosa; dióxido de silicio; almidón de maíz; talco; estearato de magnesio; esencia de naranja y limón.

Indicaciones

Síntomas ocasionados por el exceso de acidez gástrica (ardor y malestar estomacal).

Dosis

2 comprimidos masticables según necesidad, de preferencia después de las comidas. No consumir más de 12 comprimidos por día, ni por períodos prolongados. Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas consulte a su médico

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes; insuficiencia renal severa; hipercalcemia; litiasis renal cálcica; hipofosfatemia; obstrucción intestinal; hipermagnesemia.

No indicado para menores de 12 años.

Precauciones y Advertencias

Toma concomitante de glucósidos cardiotónicos y diuréticos. Pacientes con dieta baja en fósforo, diarrea, malabsorción o trasplante renal; pacientes con enfermedad de Alzheimer, apendicitis o síntomas de apendicitis, ileostomía o colostomía, estreñimiento o impactación fecal, obstrucción del piloro, hemorroides, hipoparatiroidismo, hemorragia gastrointestinal o rectal no diagnosticada, diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal o que ingieran habitualmente grandes cantidades de alcohol. Pacientes con sarcoidosis, insuficiencia

renal o riesgo de hipercalcemia. Posibilidad de ocurrencia del síndrome Álcali- Leche si se asocia a ingesta de productos lácteos en abundancia. Luego de uso prolongado o excesivo puede aumentar el pH urinario y disminuir la concentración de fosfatos y potasio séricos.

Embarazo y Lactancia

No se recomienda en embarazo por posibles efectos sobre el feto. Evaluar riesgo-beneficio.

Interacciones

Los antiácidos modifican la absorción o la excreción de muchos medicamentos, por lo que se deberá separar la toma de cualquier antiácido de otros medicamentos de 2 a 3 horas. Evitar la ingesta concomitante de lácteos.

Reacciones adversas

Puede observarse distensión abdominal, náuseas, eructos, estreñimiento. Efecto rebote, alcalosis metabólica, predisposición a nefrolitiasis luego de uso prolongado.

Presentaciones

Bisal® frutal - estuches conteniendo 10 y 20 comprimidos masticables.

Condiciones de conservación

Conservar a temperatura ambiente (15°C - 30°C).

NO UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (C.I.A.T.) – Tel.: 1722