

216095



Eurofarma

Hepamida®

Extracto de alcachofa + extracto de boldo

Colagogo - Colerético

Composición

Cada 100 mL de **Hepamida®** contiene: alcoholatura de alcachofa (*Cynara scolymus*) 50 mL; tintura de Boldo (*Peumus boldus*) 50 mL; mentol (*Menta piperita*) c.s.p. aromatizar

Propiedades

Farmacodinámicas

Hepamida® es una mezcla de hierbas medicinales, cuyas propiedades las hacen apropiadas para ser utilizadas como tratamiento sintomático de afecciones funcionales del aparato digestivo.

Hepamida® es una alcoholatura de composición cuali- cuantitativa constante y definida de las siguientes especies vegetales: ***Peumus boldus*** ("Boldo") y ***Cynara scolymus*** ("Alcachofa" o "Alcaucil").

Las especies vegetales mencionadas poseen principios activos (flavonoides, alcaloides, aceites esenciales) que les confieren múltiples propiedades medicinales:

- hepatoprotectora y colerética (**Boldo**)
- coleréticas, colagogas, hepatoprotectoras e hipocolesterolemiantes (**Alcachofa**)

Las propiedades digestivas de los componentes se expresan muy eficazmente en la combinación en que se encuentran en **Hepamida®**, sin que sea necesario usar ninguno de ellos en concentraciones que pudieran resultar incómodas o perjudiciales.

Estas propiedades conocidas popularmente desde tiempos remotos, han sido científicamente demostradas mediante numerosos ensayos in vitro e in vivo.

Las sustancias llamadas colagogos, como **Hepamida®**, aumentan la secreción de la bilis desde la vesícula biliar y estimulan la motilidad intestinal, ambas acciones mejoran la digestión.

Indicaciones

Hepamida® está indicada para corregir trastornos digestivos funcionales que afectan el proceso de digestión provocando dispepsia o sea "digestión difícil". Caracterizan esta alteración gran número de síntomas tales como dolor abdominal, distensión, eructos, meteorismo, cefaleas y somnolencia post- prandial.

Por su contenido en *Cynara scolymus* el uso habitual de **Hepamida®** puede propiciar el descenso de los niveles de colesterol plasmático.

Dosis y Administración

La dosis de **Hepamida®** para adultos es de 40 a 50 gotas diluidas en agua o jugos azucarados o edulcorados, antes o después de las comidas.

Contraindicaciones

El uso de **Hepamida**[®] está contraindicado en caso de hipersensibilidad a los principios activos o similares.

Hepamida[®] no debe administrarse si se sospecha obstrucción de la vía biliar y en casos de hepatopatía severa.

Precauciones y Advertencias

Pacientes portadores de litiasis biliar, alcohólicos y epilépticos. El uso de **Hepamida**[®] no está recomendado en niños menores de 12 años.

Embarazo y lactancia

Durante el embarazo y la lactancia no está recomendado el uso de **Hepamida**[®].

El embarazo y la lactancia son períodos a tener precaución, debido al contenido de alcohol de la formulación, además los principios amargos pueden pasar a la leche materna motivando el rechazo del lactante.

Uso pediátrico

No se aconseja administrar a niños pequeños.

Reacciones colaterales

El boldo en dosis altas puede causar irritación renal, vías urinarias, vómitos y diarrea. La alcachofa puede producir dermatitis alérgica al contacto.

Interacciones

- anticoagulantes cumarínicos

No se conocen interacciones con alimentos.

Presentaciones

Hepamida[®] - envases de 55 y 120 mL provistos de tapón gotero (20 gotas corresponden aproximadamente a 1mL).

Condiciones de conservación

Conservar a temperatura ambiente (15°C - 30°C). Proteger de la luz.

NO UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (C.I.A.T.) – Tel.: 1722

Elaborado por:



EUROFARMA URUGUAY S.A.
Democracia 2132
Tel: 2401 5454 - Fax: 2402 0808
Montevideo - Uruguay
www.eurofarma.com.uy

2160951216